

# Benadryl<sup>®</sup>

## Loratadina 24Flash VL

**ANTIALERGICO** **Rápida Disolución**

*Comprimidos desleíbles sabor Cherry* - Industria Argentina - Venta Libre

### Composición

Cada comprimido desleíble contiene: Loratadina 10 mg. Excipientes: Manitol; Polivinilpirrolidona K30; Aspartamo; Sabor Cereza; Estearil Fumarato de Sodio; Crospovidona; Lactosa Anhidra; Dióxido de Silicio Coloidal; Colorante Rojo 40 Laca.

### Acción terapéutica

Antihistamínico (antialérgico)

### Uso del medicamento

Lea atentamente esta información:

BENADRYL<sup>®</sup> 24 VL FLASH está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de síntomas causados por la alergia estacional u otras alergias de las vías aéreas superiores: secreción nasal, estornudos, ojos llorosos e irritados, picazón de nariz y /o garganta. Está indicado en caso de alergia de la piel, previo diagnóstico médico.

### Posología

Instrucciones

Colocar el comprimido en la boca, se disolverá rápidamente. Puede ser tomado con o sin agua.

BENADRYL<sup>®</sup> 24 VL FLASH provee 24 horas de alivio de síntomas de alergia, sin causar somnolencia.

Sólo un comprimido al día alivia el goteo nasal, los estornudos y los ojos llorosos e irritados. Es seguro e efectivo para adultos y niños mayores de 6 años.

Las tabletas con sabor a cherry se disuelven en su boca.

EDAD	DOSIFICACION
Adultos y niños mayores de 6 años	1 comprimido diario; no suministrar más de 1 comprimido cada 24 hs
Niños menores de 6 años	Consultar con el médico
Pacientes con enfermedad hepática o renal	Consultar con el médico

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

**NO**



**SI**



**Precaución:**

Para evitar la rotura del comprimido desleíble al extraerlo del blister, proceda de la siguiente forma: rompa el aluminio como indica el gráfico "SI", una vez roto extraiga el comprimido.

**Contraindicaciones**

No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a alguno de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años de edad, pacientes que padecen enfermedad hepática o renal. Crisis asmática.

**Precauciones y Advertencias**

Consultar con el médico antes de utilizar este producto si usted tiene enfermedad hepática o renal. Su médico deberá determinar si usted necesita una dosis diferente.

Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir reacciones que, de otro modo, serían positivas.

Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.

En embarazo y lactancia, consultar con un profesional de la salud antes de su uso.

**Reacciones Adversas**

Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación o dolor de cabeza. En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.

**0800-22-ALERGIA**

Dudas ó Consultas? (25374)

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.**

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**Sobredosificación**

En caso de sobredosificación consulte a un médico y contacte inmediatamente a los Centros de Toxicología:

- HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel. (011) 4962-6666/2247

- HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

- CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Tel. 0800-3330160

**Presentaciones**

Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos desleíbles.

No lo use si el blister conteniendo el comprimido se encuentra abierto o rasgado

Conservar a no más de 30 °C en su envase original.

Especialidad medicinal autorizada por el M.S. Certificado N°: 52.748

Elab. por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F.y A. Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Febrero 2007

502890-00

3-pm-g

