

# Benadryl®

## Loratadina 24h VL

**ANTIALERGICO**

Comprimidos  
Industria Argentina - Venta Libre

### Composición

Cada comprimido contiene: Loratadina 10,00 mg. Excipientes: lactosa monohidrato; polivinilpirrolidona K30; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; celulosa microcristalina PH102; croscarmelosa sódica.

### Acción terapéutica

Antihistamínico (antialérgico)

### Uso del medicamento

Lea atentamente esta información:

BENADRYL® 24 está indicado para el tratamiento sintomático y alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, tales como: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, y picazón de ojos, nariz y/o garganta. Está indicado en caso de alergia de la piel, previo diagnóstico médico.

### Posología

#### Cómo usar este medicamento:

**Adultos y niños mayores de 12 años:** un comprimido diario. No ingerir más de un comprimido cada 24 horas. La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

**En caso de enfermedad hepática o renal:** pregunte a su médico.

#### Contraindicaciones

No use este producto si Ud. ha tenido alguna reacción alérgica a este producto o a cualquiera de sus componentes. Embarazo, lactancia, niños menores de 2 años de edad, pacientes que padecen enfermedad hepática o renal. Crisis asmática.

## Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de usarlo si Ud. tiene alguna enfermedad hepática o renal. Su médico determinará si Ud. necesita una dosis diferente.

Cuando Ud. use este producto no ingiera más de la dosis recomendada. Ingerir una dosis mayor a la dosis recomendada puede causar somnolencia.

En caso de una alergia grave, con dificultad respiratoria, hinchazón de cara y/o manos, detenga el uso del producto y consulte inmediatamente a su médico.

Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir las reacciones que, de otro modo, serían positivas.

## 0800-22-ALERGIA

Dudas ó Consultas? (2 5 3 7 4)

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o con su farmacéutico.

## Sobredosis

En caso de sobredosificación consulte a un médico y contacte inmediatamente a los Centros de Toxicología:

- HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: Tel.: (011) 4962-6666/2247

- HOSPITAL A. POSADAS: Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777

No lo use si el blister conteniendo el comprimido se encuentra abierto o rasgado.

Almacenar entre 15° y 30° C.

## Presentación

Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos.

Esp. med. aut. por el M. S. - Certificado N°: 52.748

Elaborado por Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co. Usa. - Sanabria 2353, CABA.

Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo. Farmacéutico.

Fecha de última revisión: Enero/2006

502889-00 3-pm-g

Bajo Licencia W.L.  
  
PARKE-DAVIS

